



ДВЕНАДЦАТЬ НЕДЕЛЬ ЗАЩИТЫ

12 ПРИЧИН ВЫБРАТЬ БРАВЕКТО® НА



НЕДЕЛЬ



А ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО РЯДОМ С ВАМИ ЖИВУТ КЛЕЩИ?

КЛЕЩЕЙ МНОГО - **БРАВЕКТО®** ОДИН!



ВИДЫ КЛЕЩЕЙ



Ixodes



Rhipicephalus



Haemaphysalis



Dermacentor

БОЛЕЗНИ, ВЫЗЫВАЕМЫЕ КЛЕЩАМИ

● Анаплазмоз

▲ Эрлихиоз

◆ Бабезиоз


■ Боррелиоз

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ

*Молекулярное определение разнообразия болезней, вызываемых разными видами клещей у собак в городах России Н. В. Фоменко, И.А. Акимов, М. Ю. Иванов, Н. В. Тикунова, Р. Армстронг, С.В. Коняев <https://doi.org/10.1186/s13071-018-3161-5>
Бабезиоз собак в Калининграде, А.Б. Муромцев, ФГБОУ ВПО «Калининградский государственный технический университет», 236022, г. Калининград, Советский пр., Россия, alexandr.murmtsev@kgtu.ru



RU-BRV-200100005



1 | ДВЕНАДЦАТЬ НЕДЕЛЬ ЗАЩИТЫ

Одна доза помогает защитить вашего питомца от клещей и блох на 12 недель

12 недель



2 | АССОРТИМЕНТ БРАВЕКТО


Можно подобрать подходящую по весу животного упаковку

В виде жевательных таблеток или капель*

Для всех пород собак и кошек



3 | ПРОСТОТА ПРИМЕНЕНИЯ

Применять Бравекто® очень просто. Большинство собак охотно съедают жевательные таблетки Бравекто®¹




4 | АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Для кошек и собак Бравекто® в виде капель* с защитой на 12 недель.



5 | ДЕЙСТВИЕ НА КЛЕЩЕЙ И БЛОХ

Бравекто® начинает действовать на паразитов в течение одного дня



6 | СНИЖАЕТ РИСК БОЛЕЗНЕЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ КЛЕЩАМИ

Бравекто® снижает риск заражения собак бабезиозом (пироплазмозом)² - это одно из опасных заболеваний, вызываемых иксодовыми клещами



7 | ДЕЙСТВУЕТ НА БЛОХ И ИХ ПОТОМСТВО

Бравекто® воздействует на блох раньше, чем они успевают произвести потомство⁴, тем самым прерывая их жизненный цикл



8 | СВОЕВРЕМЕННАЯ ЗАЩИТА

Снижает риск передачи ленточных гельминтов *Dipylidium caninum* от зараженных блох*



9 | СОВМЕСТИМ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ

Бравекто® сочетается:

С препаратами от глистов³

С инсектоакарицидными ошейниками

С нестероидными противовоспалительными препаратами

10 | МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ В ОСОБЫХ СИТУАЦИЯХ

Допустимо применение щенкам в возрасте от 8 недель. При необходимости допускается применение сукам в период щенности и лактации под контролем ветеринарного врача



11 | НЕ СМЫВАЕТСЯ ВОДОЙ

Животное можно мыть и купать даже с шампунем, после ознакомления с инструкцией



12 | МИНИМИЗАЦИЯ РИСКА ПРОПУСКА ПРИЕМА

Бравекто® действует на протяжении 12 недель, и вы можете забыть о необходимости ежемесячных обработок



ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ

*Бравекто Спот Он, раствор для наружного нанесения

¹ЧЕЙНЕЙ МЕДОУЗ И ДР. ПАРАЗИТС ЭНД ВЕКТОРЗ 2014 7:375

²ПРОФИЛАКТИКА ПЕРЕДАЧИ ИНФЕКЦИИ ВАБЕЗИА CANIS КЛЕЩАМИ DERMAPENTOR RETICULATUS СОБАКАМ: ПОЛУЧАЮЩИМ ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ ТАБЛЕТКИ ФЛУРАЛАДЕРА (БРАВЕКТО®) ПЕРОРАЛЬНО ЯНИНА ТЭНЗЛЕР, ДЖУЛИАН Е. ЛИБЕНБЕРГ, РАЙНЕР К.А. РЕЙКЕ И АНЖА Р. ХЕНКЕРОТ. ПАРАЗИТС ЭНД ВЕКТОРЗ 2015 6:305. ОПУБЛИКОВАНО 4 ИЮНЯ 2015 ГОДА

⁴ЯНИНА ТЭНЗЛЕР И ДР. ПАРАЗИТС ЭНД ВЕКТОРЗ 2014 7:567

^{*}ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФЛУРАЛАДЕРА ПРИ НАРУЖНОМ ПРИМЕНЕНИИ И ПРИЧЕМ ВНАРУТ ПРОТИВ ПЕРЕДАЧИ БЛОХАМИ (СТЕНОСЕРНАЛДЕС FELIS) И ВАЗИИ DIPYLIDIUM CANINUM СОБАКАМ Д.ТОПИАБ, Л.МЕЙЕРДЖ, С.ИТ. РАМСТРОНГ

³ФЕЛИ М УОЛТЕР И ДР. ПАРАЗИТС ЭНД ВЕКТОРЗ 2014 7:481